

## **RENNIE DEFLATINE, comprimé à croquer**

### **COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE**

Carbonate de calcium.....680 mg  
Carbonate de magnésium lourd .....80 mg  
Diméticone activé.....25 mg  
Excipients : sorbitol, talc, amidon de maïs prégélatinisé, amidon de pomme de terre, stéarate de magnésium, arôme menthe, arôme citron, pour un comprimé.

### **FORME PHARMACEUTIQUE**

Comprimé à croquer. Etui de 18 comprimés.

### **CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE**

ANTIACIDE (A : appareil digestif et métabolisme).

### **NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT / FABRICANT**

Bayer santé Familiale, 33 rue de l'Industrie – F-74240 GAILLARD

### **DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?**

Ce médicament est indiqué chez l'adulte (plus de 15 ans) en cas de brûlures d'estomac (excès d'acidité gastrique) associées à des ballonnements.

### **ATTENTION !**

### **DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?**

VOUS NE DEVEZ PAS PRENDRE ce médicament en cas de maladie rénale (défaillance des fonctions du rein) du fait de la présence de carbonates de calcium et de magnésium.  
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### **MISES EN GARDE SPECIALES**

NE LAISSEZ PAS CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.  
Si les troubles ne disparaissent pas en une dizaine de jours, et/ou si les douleurs sont associées à une fièvre et/ou des vomissements, IL CONVIENT DE CONSULTER VOTRE MEDECIN.

En raison de la présence de sorbitol, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose (maladie métabolique héréditaire).

### **PRECAUTIONS D'EMPLOI**

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### **INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS**

Les antiacides peuvent diminuer l'effet de nombreux autres médicaments. Il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

Par précaution, il convient de ne pas prendre au même moment RENNIE et un autre médicament. Cet autre médicament pourra être pris à distance de RENNIE (par exemple 2 heures avant).

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS NOCIVES ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN TOUT TRAITEMENT EN COURS.

## **SI VOUS ETES ENCEINTE OU SI VOUS ALLAITEZ**

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.  
Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre ce traitement.

D'UNE FACON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

**LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NECESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS** : Sorbitol.

## **COMMENT DEVEZ-VOUS UTILISER CE MEDICAMENT ?**

### **POSOLOGIE**

Voie orale  
Réservé à l'ADULTE (plus de 15 ans).

La posologie usuelle est de 1 à 2 comprimés 2 à 3 fois par jour au moment des douleurs. Ne pas dépasser 7 comprimés par jour.

### **MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION**

Voie orale.  
Sucez ou croquez les comprimés.

### **FREQUENCE ET MOMENT D'ADMINISTRATION**

Prenez 1 à 2 comprimés au moment des douleurs.  
Respectez la posologie maximale.

### **EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS**

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

- A doses fortes et prolongées, survenue possible de calculs et troubles rénaux graves.
- Des troubles du transit intestinal tels que diarrhée peuvent survenir.

SIGNELEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

### **CONSERVATION**

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

**DATE DE REVISION DE LA NOTICE** : 13 octobre 1998